

Gebrauchsinformation

Bepanthen®

Wirkstoff: **Dexpanthenol**



CREME

Heilt Wunde und geschädigte Haut und Schleimhaut

Z.Nr. 17.233

Zulassungsinhaber nach Arzneimittelgesetz §11

Bayer Austria, Wien

Hersteller

GP Grenzach Produktions GmbH, 79639 Grenzach-Wyhlen, Deutschland

Zusammensetzung

1 g Creme enthält als *Wirkstoff* 50 mg (= 5 %) **Dexpanthenol** und als *andere Bestandteile* 5 mg (= 0,5 %) Phenoxyethanol, Amphisol K, Cetylalkohol, Isopropylmyristat, DL-Pantolacton, Propylenglycol, Stearylalkohol, gereinigtes Wasser und Wollwachs.

Eigenschaften und Wirksamkeit

Bepanthen fördert die Heilung von Wunden und Entzündungen der Haut und der Schleimhäute.

Dexpanthenol wird im Organismus in Pantothenensäure umgewandelt, die ein Vitamin des B-Komplexes ist. Pantothenensäure ist notwendig für den Aufbau von Haut und Schleimhäuten.

Bepanthen steht in drei Darreichungsformen zur Verfügung: Creme, Wund- und Heilsalbe, Lösung. Die Wahl richtet sich nach der jeweiligen Körperstelle und der Hautbeschaffenheit.

Die **Creme**, als nicht fettende Form, wird vor allem für nässende Wunden, für unbedeckte Körperstellen (wie z.B. Gesicht) oder behaarte Körperteile empfohlen. Ihre leichte Verstreichbarkeit macht sie zudem besonders geeignet für die Anwendung bei schmerzhaftem Sonnenbrand und leichten Verbrennungen.

Anwendungsgebiete

Zur äußerlichen Behandlung von Wunden und Entzündungen von Haut und Schleimhäuten wie zum Beispiel:

- Sonnenbrand, leichte Hautverletzungen, Schürfwunden, Afterschrunden, Brandwunden, zur Förderung des Gewebewachstums nach Verbrennungen;
- zur Verhütung und Behandlung von Wunden Brustwarzen;
- in der Säuglingspflege zur Verhütung und Heilung von Wundsein.

Art der Anwendung

Zum Auftragen auf die gereinigte Wunde, geschädigte oder entzündete Haut oder Schleimhaut.

Dosierung

Falls nicht anders verordnet, Dosierung genau einhalten.


Ein- bis dreimal täglich auftragen.


Wunde Brustwarzen: unmittelbar nach jedem Stillen mit Cremekompressen bedecken.

In der Säuglingspflege: nach jedem Trockenlegen auftragen.

Gegenanzeigen

Bei Bestehen einer Überempfindlichkeit gegen Dexpanthenol und/oder Phenoxyethanol dürfen Sie Bepanthen - Creme nicht anwenden.





Schwangerschaft und Stillperiode

Bepanthen darf in der Schwangerschaft und während der Stillperiode angewendet werden.

Nebenwirkungen

Bepanthen ist sehr gut verträglich.

In Ausnahmefällen können allergische Hautreaktionen (z.B. Rötung, Brennen, Jucken) auftreten.

Wechselwirkungen und Gewöhnungseffekte

sind für Bepanthen nicht bekannt.

Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung

Bei Fortbestehen der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich. Ebenso soll das Auftreten von Nebenwirkungen dem Arzt gemeldet werden.

Ihr Arzt kann Ihnen Bepanthen auch für andere Anwendungsgebiete verschreiben. Beachten Sie in diesem Fall genau seine Anweisungen.

Verfalldatum beachten.

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Packungsgrößen und Lagerungshinweise

30 g

Nicht über 25 °C lagern.

Diese Gebrauchsinformation wurde im Juni 2003 geändert.

Bei Unklarheiten fachliche Beratung einholen.

