

Gebrauchsinformation

Bepanthen® Plus



CREME

Desinfizierende Wundcreme

Z.Nr. 1-19149

Zulassungsinhaber nach Arzneimittelgesetz §11
Bayer Austria, Wien

Hersteller
GP Grenzach Produktions GmbH, 79639 Grenzach-Wyhlen, Deutschland

Zusammensetzung

1 g Creme enthält als *Wirkstoffe* 50 mg (= 5 %) **Dexpanthenol** und 5 mg (= 0,5 %) **Chlorhexidin-Dihydrochlorid** und als *andere Bestandteile* D-Pantolactone, Cetylalkohol, Paraffin, Polyoxyl 40 Stearate, Stearylalkohol, Wollfett und gereinigtes Wasser.

Eigenschaften und Wirksamkeit

Dexpanthenol wird in den Zellen rasch in Pantothensäure umgewandelt, welche eine zentrale Rolle im Stoffwechsel jeder Zelle spielt.

Pantothensäure ist ein Vitamin des B-Komplexes und ist notwendig für den Aufbau von Haut und Schleimhäuten. Pantothensäure beschleunigt die Wundheilung und erhöht die Reißfestigkeit des Gewebes.

Chlorhexidin ist ein bekanntes und gut verträgliches Desinfektionsmittel. Es tötet jene Bakterien ab, die hauptsächlich für Infektionen der Haut in Frage kommen.

Anwendungsgebiete

Wunden aller Art mit Infektionsgefahr:

Schürfungen, Schnitt- und Kratzwunden, Hautschunden und -risse, Brandwunden, zur Förderung des Gewebewachstums nach Verbrennungen, Wundsein, Hautentzündungen.

Für die Behandlung einer nicht speziell infektionsgefährdeten Hautreizung (z.B. Sonnenbrand) soll Bepanthen Plus nicht verwendet werden; in diesen Fällen empfiehlt sich dann die Anwendung von Bepanthen - Creme.

Art der Anwendung

Zum Auftragen auf Wunden und entzündete Hautstellen.

Dosierung

Falls nicht anders verordnet, Dosierung genau einhalten.


Ein- bis dreimal täglich auftragen.

Gegenanzeigen

Bei Bestehen einer Überempfindlichkeit gegen einen der beiden Wirkstoffe dürfen Sie Bepanthen Plus - Creme nicht anwenden.

Schwangerschaft und Stillperiode

Bepanthen Plus kann in der Schwangerschaft und während der Stillperiode angewendet werden.





Nebenwirkungen

In seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen sowie Brennen nach dem Auftragen des Präparates beobachtet werden.

Wechselwirkungen und Gewöhnungseffekte

sind für Bepanthen Plus bisher nicht bekannt.

Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung

Es ist zu vermeiden, daß Bepanthen Plus in die Augen oder auf Schleimhäute gelangt.

Wenn die im Kapitel »Nebenwirkungen« beschriebenen Reaktionen auftreten, melden Sie diese bitte Ihrem Arzt.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Bepanthen Plus führt zu keiner Verfärbung der Wäsche.

Verfalldatum beachten.

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.



Packungsgrößen und Lagerungshinweise

30 g

Nicht über 25 °C lagern.

Datum der letzten Änderung

13. November 1996

Bei Unklarheiten fachliche Beratung einholen.