

Bepanthen®

Wirkstoff: **Dexpanthenol**



WUND- UND HEILSALBE

Heilt Wunde und geschädigte Haut und Schleimhaut

Z.Nr. 7.158

Zulassungsinhaber nach Arzneimittelgesetz § 11

Bayer Austria, Wien

Hersteller

GP Grenzach Produktions GmbH, 79639 Grenzach-Wyhlen, Deutschland

Zusammensetzung

1 g Wund- und Heilsalbe enthält als *Wirkstoff* 50 mg (= 5 %) **Dexpanthenol** und als *andere Bestandteile* Cetylalkohol, Mandelöl, Paraffinöl, Protegin X, Stearylalkohol, weiße Vaseline, weißes Wachs, gereinigtes Wasser und Wollfett.

Eigenschaften und Wirksamkeit

Bepanthen fördert die Heilung von Wunden und Entzündungen der Haut und der Schleimhäute.

Dexpanthenol wird im Organismus in Pantothenensäure umgewandelt, die ein Vitamin des B-Komplexes ist. Pantothenensäure ist notwendig für den Aufbau von Haut und Schleimhäuten.

Bepanthen steht in drei Darreichungsformen zur Verfügung: Wund- und Heilsalbe, Creme und Lösung. Die Wahl richtet sich nach der jeweiligen Körperstelle und der Hautbeschaffenheit.

Die **Wund- und Heilsalbe** enthält einen hohen Fettanteil und wird vor allem zur Behandlung bei trockener Haut empfohlen. Sie fördert die Bildung des jungen Narbengewebes und die rasche Schließung der Wunde.

Anwendungsgebiete

Zur äußerlichen Behandlung von Wunden und Entzündungen von Haut und Schleimhäuten wie zum Beispiel:

- Sonnenbrand, leichte Hautverletzungen, Schürfwunden, Afterschrunden, Brandwunden, zur Förderung des Gewebewachstums nach Verbrennungen;
- zur Verhütung und Behandlung von Wunden Brustwarzen;
- in der Säuglingspflege zur Verhütung und Heilung von Wundsein.

Art der Anwendung

Zum Auftragen auf die gereinigte Wunde, geschädigte oder entzündete Haut oder Schleimhaut.

Dosierung

Falls nicht anders verordnet, Dosierung genau einhalten.


Ein- bis dreimal täglich auftragen.


Wunde Brustwarzen: unmittelbar nach jedem Stillen mit Salbenkompressen bedecken.

In der Säuglingspflege: nach jedem Trockenlegen auftragen.

Gegenanzeigen

Bei Bestehen einer Überempfindlichkeit gegen Dexpanthenol dürfen Sie Bepanthen - Wund- und Heilsalbe nicht anwenden.





Schwangerschaft und Stillperiode

Bepanthen darf in der Schwangerschaft und während der Stillperiode angewendet werden.

Nebenwirkungen

Bepanthen ist sehr gut verträglich.

In Ausnahmefällen können allergische Hautreaktionen (z.B. Rötung, Brennen, Jucken) auftreten.

Wechselwirkungen und Gewöhnungseffekte

sind für Bepanthen nicht bekannt.

Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung

Bei Fortbestehen der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich. Ebenso soll das Auftreten von Nebenwirkungen dem Arzt gemeldet werden.

Ihr Arzt kann Ihnen Bepanthen auch für andere Anwendungsgebiete verschreiben. Beachten Sie in diesem Fall genau seine Anweisungen.

Verfalldatum beachten.

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Packungsgrößen und Lagerungshinweise

3,5, 30 und 100 g

Nicht über 25 °C lagern.

Bei Unklarheiten fachliche Beratung einholen.

Diese Gebrauchsinformation wurde im Oktober 2002 geändert.

