



# BEPANTHEN® PLUS - SPRAY

Wirkstoffe: Dexpanthenol und Chlorhexidindigluconat-Lösung



Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Bepanthen Plus - Spray jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Bepanthen Plus - Spray und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Bepanthen Plus - Spray beachten?
3. Wie ist Bepanthen Plus - Spray anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Bepanthen Plus - Spray aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1. WAS IST BEPANTHEN PLUS - SPRAY UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Der Wirkstoff Dexpanthenol wird in den Zellen rasch in Pantothenensäure umgewandelt, die ein Vitamin des B-Komplexes ist. Pantothenensäure ist unentbehrlich für den Aufbau und die Regeneration von Haut und Schleimhaut.

Der Wirkstoff Chlorhexidindigluconat-Lösung ist ein bekanntes und gut verträgliches Desinfektionsmittel. Es tötet jene Bakterien ab, die hauptsächlich für Infektionen der Haut verantwortlich sind.

Bepanthen Plus - Spray wird zur Behandlung von oberflächlichen Wunden aller Art verwendet, wenn das Risiko einer Infektion besteht: z.B. Schürf-, Schnitt- und Kratzwunden und Verbrennungen der Haut.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON BEPANTHEN PLUS - SPRAY BEACHTEN

**Bepanthen Plus - Spray darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Dexpanthenol, Chlorhexidin oder einen der sonstigen Bestandteile von Bepanthen Plus - Spray sind
- wenn das Trommelfell beschädigt ist, dürfen Sie Bepanthen Plus - Spray nicht im Ohr anwenden

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Bepanthen Plus - Spray ist erforderlich:**

Bepanthen Plus - Spray soll nicht angewendet werden bei tiefen Wunden, Unterschenkelgeschwüren (Ulcus cruris) und unter undurchlässigen Verbänden.

Vermeiden Sie, dass Bepanthen Plus - Spray mit Augen und Schleimhäuten in Berührung kommt.

Bepanthen Plus - Spray soll nicht bei Säuglingen angewendet werden, da es nach versehentlicher Inhalation zu Reizerscheinungen der Atemwege kommen kann.

Für die Behandlung einer nicht speziell infektionsgefährdeten Hautreizung (z.B. Sonnenbrand) sollte Bepanthen Plus - Spray nicht verwendet werden; in diesen Fällen empfiehlt sich die Anwendung von Bepanthen - Creme.

**Bei Anwendung von Bepanthen Plus - Spray mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bepanthen Plus - Spray darf nicht gleichzeitig mit anderen Desinfektionsmitteln sowie Seifen angewendet werden.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Bepanthen Plus - Spray sollte während der Schwangerschaft nicht großflächig angewendet werden. Stillende sollten Bepanthen Plus - Spray nicht im Bereich der Brust und nicht großflächig anwenden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Bepanthen Plus - Spray hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.



### 3. WIE IST BEPANTHEN PLUS - SPRAY ANZUWENDEN?

Bepanthen Plus - Spray kann nach Bedarf ein- bis mehrmals täglich auf die gereinigte Wunde oder entzündete Hautareale aufgetragen werden. Die Dauer der Anwendung richtet sich nach Art und Verlauf der Erkrankung und beträgt erfahrungsgemäß ca. 1 – 2 Wochen.

Kinder:

Aufgrund der Darreichungsform als Spray wird die Anwendung bei Säuglingen nicht empfohlen.

Vor der erstmaligen Anwendung muss der Sprühkopf einige Male betätigt werden, bevor die Lösung versprüht werden kann.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Bepanthen Plus - Spray Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Erkrankungen des Immunsystems:

*Sehr selten* (weniger als 1 Behandler von 10.000):

Generalisierte allergische Reaktionen

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes:

*Sehr selten* (weniger als 1 Behandler von 10.000):

Allergische Hautreaktionen (z.B. Rötung, Jucken)

*Gelegentlich* (1 bis 10 Behandelte von 1000):

Brennen

### 5. WIE IST BEPANTHEN PLUS - SPRAY AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25 °C lagern.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Nach Öffnen der Flasche ist Bepanthen Plus-Spray 12 Monate verwendbar.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

### 6. WEITERE INFORMATIONEN

**Was Bepanthen Plus - Spray enthält**

- 1 ml Bepanthen Plus - Spray enthält als Wirkstoffe 50 mg (= 5 %) Dexpanthenol und Chlorhexidindigluconat-Lösung 20 % entsprechend 5 mg (= 0,5 %) Chlorhexidingluconat.
- Die sonstigen Bestandteile sind: DL-Pantolaktol, Macrogol-Laurylether, Ethanol und gereinigtes Wasser.

**Wie Bepanthen Plus - Spray aussieht und Inhalt der Packung**

Dieses Arzneimittel ist ein Spray zur Anwendung auf der Haut.

Die Verpackung besteht aus einer HDPE-Flasche mit Sprühpumpe und Schutzkappe, Inhalt 30 ml.

**Pharmazeutischer Unternehmer:**

Bayer Austria Gesellschaft m.b.H.

Herbststraße 6 – 10

1160 Wien

**Hersteller:**

Lichtenheldt GmbH, 23812 Wahlstedt, Deutschland

Z.Nr.: 1-28057

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Februar 2009

**Bayer**

